様

年 月 日 患者本人/家族または代理人

|      | 手術前日  | 手術当日  |   | 急性期   | 回復期                        |                          | 退院日  |
|------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------|--|
|      | ( / )   | (   | / )   | ( / )   | ( / )                      | ( / )                    | ( / )  |
|      | 入院(1日目)   | 手術前(2日目)  | 手術後(2日目)  | 術後1日目(3日目)  | 術後2日目(4日目)                 | 術後3日目(5日目)               | 術後4日目(6日目)~退院                                    |
| 投薬注射 | ・19時頃下剤2錠服用します  | <ul><li>手術時間に合わせて点滴を<br/>開始します</li><li>麻酔を効きやすくする注射を<br/>肩に行います(場合により<br/>行わない方もいます)</li></ul>      | ・点滴を持続的に行います  | <ul><li>・朝 点滴を終了します</li><li>・痛み止めの内服薬をお渡しします</li><li>・薬剤師の説明通り服用してください</li><li>・持参薬は医師の許可が出てから開始します</li></ul> |                            | PI服薬                     | ・退院時痛み止めが足り<br>ない場合は追加でお渡し<br>します                |
| 指示処置 | 手術の為の準備をします ・お臍をきれいにします ・必要時、体の毛を剃ります ・爪を切ってください ・マニキュア、ジェルネイル を全て落としてください                    | <ul><li>・排便がないときは、浣腸をすることがあります</li><li>・弾性ストッキングをはきます</li><li>・画</li></ul>                          | <ul> <li>・心電図モニターをつけます</li> <li>・鼻から管が入っています</li> <li>・酸素マスクをつけています</li> <li>→2時間後に異常がなければ</li> <li>外します</li> <li>・創部は透明フィルムで保護してあります</li> <li>・お腹に管が入る場合があります</li> </ul> | ・歩行を確認できたら、弾性<br>ストッキングは脱ぎます<br>看護計画<br>#3 転倒・転落の<br>歩く練習をしましょう   |                            | 看護計画<br>#6 退院後<br>退院までに  | ・お臍のテープをはがします<br><b>後の生活に対する不安</b><br>わからないことを一緒 |
| 検査   | <u>不安</u>   | 入院・手術に関連する  |   | <ul><li>・採血があります</li><li>・必要時レントゲンがあります</li></ul>   |                            | に解決して                    | いきましょう   |
| 安静度  | 『沥槐闪日出(ジウ   | ちない事不安な事があれば<br>下さい   | <ul><li>・ベッド上で安静にしていて下さい</li><li>・横向きになることはできます</li><li>看護計画</li><li>#2 術後合併症の予防</li><li>異常の早期発見に努めます</li></ul>   | ・尿の管が抜けたら歩行できます<br>・ベッドから足を下ろして座り、大丈夫なら洗面、トイレまで歩きましょう(初めて歩かれるときは看護師を呼んでください)                                  |                            | R々に行動範囲を広い<br>しが、外出・外泊は記 |  |
| 栄養   | ・夜9時以降飲んだり食べ<br>たりできません   | ・飲んだり食べたりできま<br>せん  |   | 食事を開始します<br>・朝食 3分粥<br>・昼食 7分粥<br>・夕食 ご飯  |                            | を士より栄養指導がな<br>レストランにてお食  | あります<br>事をしていただきます                               |
| 清潔   | ・お臍をきれいにした後<br>シャワー浴をします。<br>シャワー室は10~18時の<br>間にご利用ください                                       | <ul><li>朝はいつものように洗面をして下さい</li><li>手術着に着替えます</li><li>入れ歯、指輪、時計、コンタクトレンズ、眼鏡、ヘアピンなど外しておいて下さい</li></ul> |   | ・体を拭いて着替えをします<br>看護計画<br>#4 セルフケア不足<br>体拭きのお手伝いをしま  |                            | きます                      |  |
| 排泄   |   |   | <ul><li>・尿の管が入っています</li></ul>   | ・起床後、抜去します  | △看護計画                      |                          |  |
| 説明指導 | <ul><li>・手術前1週間は禁煙をしましょう</li><li>・入院、手術に必要なものを準備しましょう</li><li>・手術同意書、入院時書類を提出してください</li></ul> | ・ご家族は手術前までに<br>ご来院ください  |   | ・腹腔鏡手術の影響で肩こり<br>や頭痛の症状が出ることも<br>ありますが、一時的なもの<br>なので心配ありません   | #5 <u>疼痛コント</u><br>痛い時は伝えて |                          | ・状態が落ち着いたら<br>退院可能です。医師<br>と相談して退院日を<br>決めましょう   |
| 観察   | ・1日1回検温をします<br>・腹部の観察を行います  |   | ・手術後2時間は15分〜1時間置き<br>に検温を行います<br>・創部の観察を行います  | ・検温をします   |                            | 0                        |  |